

## BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTÉE.

5180 SOUTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, ON, L7L 5H4

Renseignements sur le produit : 1-800-263-5103

Déclaration des réactions : 1-877-565-5501

Site Web : [www.boehringer-ingelheim.ca](http://www.boehringer-ingelheim.ca)



Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de l'information ci-incluse. La responsabilité est aux lecteurs de se familiariser avec l'étiquette du produit Canadien ou le feuillet d'information de l'emballage.

## BOVIKALC®

### BOEHRINGER

**Usage vétérinaire seulement**  
**SUPLÉMENT CALCIQUE ORAL**  
POUR VACHES FRAÎCHEMENT VÊLÉES

**Mises en garde :** Un délai d'attente pour la viande et une période de retrait pour le lait ne sont pas requis lorsqu'utilisés selon les directives. Garder hors de la portée des enfants.

NN.S0Z9

LIBÉRATION DE CALCIUM RAPIDE ET SOUTENUE

Bovikalc® est un supplément de calcium par voie orale utilisé avant ou après la parturition chez les vaches fraîchement vêlées.

**Mode d'emploi :** Protocole minimum : Administrer un bolus immédiatement après le vêlage, puis administrer un deuxième bolus 12 à 24 heures après le vêlage. N'administrer les bolus qu'avec l'applicateur Bovikalc®.

Protocole prolongé : Dans le cas de vaches au rendement élevé, administrer le :

- 1<sup>er</sup> bolus dès les premiers signes de parturition;
- 2<sup>e</sup> bolus immédiatement après le vêlage;
- 3<sup>e</sup> bolus 12 à 24 heures après le vêlage;
- 4<sup>e</sup> bolus 24 à 48 heures après le vêlage.

Veillez discuter du protocole avec votre médecin vétérinaire avant de procéder à l'administration.

Placer le bolus dans l'applicateur de bolus; s'assurer que l'extrémité arrondie pointe vers l'extérieur. Dans le cas d'une personne droitrière, se placer à la droite de la vache.

Avec la main gauche, saisir la mâchoire supérieure et lever la tête de la vache. Garder la tête de la vache à un angle naturel et légèrement orientée dans la direction de la personne qui administre le bolus. Placer délicatement l'applicateur de bolus contenant un bolus Bovikalc dans la gueule de la vache.

Lorsqu'une résistance se fait sentir, diriger délicatement l'applicateur au-dessus de la langue. Lorsque l'applicateur de bolus se trouve à l'ouverture de la gorge, appuyer sur le manche pour libérer le bolus.

Attendre quelques instants jusqu'à ce que la vache ait dégluti, puis retirer l'applicateur de la gueule de la vache.

**Ingrédients actifs par bolus :** chlorure de calcium - 579,1 mg/g, sulfate de calcium - 231,6 mg/g

**Ingrédients inactifs :** eau, monoglycérides acétylés, gomme xanthane

**Contre-indications :** Ne pas utiliser pour le traitement initial de la fièvre vitulaire, en présence de signes cliniques de fièvre vitulaire ou chez les vaches étendues.

Ne pas utiliser les bolus brisés ou endommagés.

Entreposer à une température égale ou inférieure à 30 °C. Les bolus sont sensibles à l'humidité et doivent être entreposés dans les tubes en plastique jusqu'à leur utilisation.

**Attention! Ne pas utiliser les bolus brisés ou endommagés.**



**Nom du déclarant :** Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 5180 South Service Rd., Burlington, ON L7L 5H4

**Fabriqué par :** Boehringer Ingelheim Denmark A/S, DK-2100 Copenhagen OE, 208-R854833

**Contenu net:** 4 x 192 g BOLUS 125887-001

**CPN:** 1494126.0

Bovikalc® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.